

عنوان مقاله:

بررسی اختلال مصرف مواد در بیماران هموفیلی در بیمارستان علی اصغر زاهدان سال 1397

محل انتشار:

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

فاطمه سرحدی - کارشناس مامایی، مرکز بهداشت و درمان استان سیستان و بلوچستان، زاهدان

محبوبه رمرودی - کارشناس مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

محدثه سمیعی - دانشجوی کارشناسی مامایی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل

فایزه سرحدی - دانشجوی کارشناسی پرستاری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اختلال مصرف مواد در بیماران هموفیلی در بیمارستان علی اصغر شهر زاهدان بوده است. مواد و روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی بود که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری را بیماران هموفیلی بالای 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر شهرستان زاهدان تشکیل داده اند. جمع آوری داده های ما بر اساس فرم اطلاعاتی و پرسشنامه ی آزمون غربالگری وابستگی به الکل، سیگار و مواد ویرایش سوم بود. در ابتدا پس از هماهنگی با ریاست بیمارستان علی اصغر فرم اطلاعاتی و پرسشنامه ها بین بیماران توزیع شد و پس از تکمیل، فرم ها جمع آوری شده و اطلاعات حاصله وارد نرم افزار spss گردید. نتایج: در انتهای مطالعه تعداد 80 بیمار وارد مطالعه شدند. از این تعداد 24 بیمار مونث و 56 بیمار مذکر بودند. 28 بیمار (35%) (0) اختلال مصرف مواد داشتند. از بین افراد مورد مطالعه 46 بیمار (5 / 57) بیان نمودند، درد دارند و میانگین شدت درد افراد در این مطالعه 21 / 8 + 12 / 2 رنج (1-10) بوده است. از نظر شدت درد اختلاف آماری معناداری بین این دو گروه وجود نداشت 0 . 212 = (p . vale). همچنین بررسی های ما نشان داد از نظر جنسیت، سن، سابقه سوء مصرف مواد در خانواده، میزان تحصیلات، نوع کمبود فاکتور انعقادی، نوع فاکتور انعقادی دریافتی و تعداد مفاصل درگیری اختلاف معنی داری بین بیماران با سوء مصرف در مقایسه با بیماران نرمال وجود داشت (0 . 05 < p . vale). در حالی که بین این دو گروه از نظر وجود سابقه جراحی، مدت وجود درد و سن تشخیص بیماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد 0.05 > . (p . vale) نتیجه گیری: در انتهای مطالعه و به عنوان نتیجه گیری پایانی می توان بیان کرد با توجه به شیوع بالای سوء مصرف در بیماران مبتلا به هموفیلی نسبت به جمعیت عمومی جامعه در نظر گرفتن راهکارهایی برای مدیریت بهتر و درمان حمایتی فراگیر در این بیمار مورد نیاز می باشد.

کلمات کلیدی:

هموفیلی، وابستگی به مواد، سوء مصرف مواد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/854284>

