

عنوان مقاله:

ارتباط عمل به باورهای دینی با رنج در بیماران همودیالیزی

محل انتشار:

اولین همایش ملی مراقبت و درمان (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:

آمنه مولایی - گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی ابادکتول، ایران

سیداحمد حسینی - گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی ابادکتول، ایران

حمید حجتی - گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی ابادکتول، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: نارسایی مزمن کلیه اختلال پیشرفته و برگشت ناپذیر عملکرد کلیه می باشد. به عنوان یکی از مشکلات رایج سلامتی در دنیا گسترش پیدا نموده است از این رو مطالعه با هدف ارتباط عمل به باورهای دینی با رنج در بیماران دیالیزی انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی همبستگی در سال 1397 بر روی بیماران همودیالیزی به تعداد 130 نفر از بیماران همودیالیزی شهر گنبد کاووس انجام شد. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه عمل به باورهای دینی معبد و پرسشنامه تجربه و ادراک رنج اسکالز بود. اطلاعات بعد از جمع اوری وارد نرم افزار spss 16 شد که توسط امار توصیفی (جداول، میانگین، انحراف معیار) و امار استنبازی (انالیز واریانس و تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و من ویتنی) صورت گرفت. یافته ها: میزان باور به عمل های دینی را با میانگین و انحراف معیار $16/72 + 36/11$ و میزان رنج بیماران را $28/37 + 94/6$ نشان داد. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن اختلاف معنی داری را بین عمل به باورهای دینی با رنج نشان داد ($r=0.03$, $P=0.18$) طوری که با افزایش باور به عمل های دینی میزان رنج بیماران کمتر می شد. نتیجه گیری: باتوجه به اینکه عمل به باورهای دینی موجب کاهش رنج در بیماران دیالیزی می شود. مسئولین و دست اندرکاران بهداشتی به خصوص تیم پرستاری می تواند با درک نیازهای معنوی بیماران و کمک به رفع این نیازها موجب کاهش رنج و افزایش سازگاری در بیماران شود

کلمات کلیدی:

عمل به باورهای دینی، رنج، همودیالیز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/878787>

