

عنوان مقاله:

بررسی مقایسه ای ابتلا به واژینال کاندیدیازیس در زنان حامله و غیر حامله

محل انتشار:

مجله دانشکده پرستاری ارتش، دوره 9، شماره 1 (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

مرجان سید مظهری - کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا

فریبا توده فلاح - دکترای علوم آزمایشگاهی

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: ابتلای واژن به عفونت های باکتریایی شایع ترین علت عفونت های واژینال است و پس از آن ولوو واژینال کاندیدیازیس بیشترین درصد عفونت های واژینال را به خود اختصاص می دهد. کاندیداها دسته ای از مخمر های مهم در پزشکی هستند که بوسیله بلاستوکوییدیا، تکثیر حاصل می نمایند و قادرند میسیلوم کاذب یا حقیقی تولید کنند. کاندیدیازیس نیز یک عفونت حاد تا تحت حاد است که بوسیله انواع کاندیداها ایجاد می شود در این عفونت، قارچ ممکن است تولید ضایعاتی در دهان، واژن، پوست، ناخن ها، برونش یا ریه نموده، یا به صورت بیماری منتشر در آمده و باعث سپتی سمی، آندوکاردیت و مننژیت گردد. علاوه بر آن وجود کاندید یازیس در حاملگی می تواند به نوزاد منتقل شود و سبب ایجاد برفک های دهانی در نوزاد به هنگام زایمان گردد. تحقیق حاضر با هدف تعیین مقایسه ای ابتلا به واژینال کاندیدیازیس در زنان حامله و غیر حامله انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی نمونه واژن 340 نفر زن حامله و 175 نفر زن غیر حامله مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام علی شهرستان کرج، بطور تصادفی بررسی شده نمونه های فوق تحت بررسی مستقیم میکروسکوپی با پتاس 10 درصد و همچنین کشت در محیط سابورو دکستروز آگار قرار گرفتند و میزان ابتلا به این عارضه مورد بررسی قرار گرفت. یافت ها: از 340 نفر زن حامله مورد بررسی در این پژوهش تعداد 108 نفروز 175 نفر زن غیرحامله مورد بررسی، تعداد 26 نفر مبتلا به واژینال کاندیدیازیس بودند. بنابراین میزان شیوع واژینال کاندید یازیس در زنان حامله برابر 31/76 درصد و در زنان غیرحامله برابر 14/85 درصد است که نشان م ی دهد میزان شیوع این عفونت در زنان حامله 2 برابر زنان غیر حامله می باشد. آزمون کای دو نیز نشان می دهد که بین ابتلا به واژینال کاندیدیازیس و حاملگی رابطه معنی داری وجود دارد $P < 0/01$ همچنین نتایج این تحقیق نشان داده که در زنان حامله میزان ابتلا به واژینال کاندیدیازیس در نوبت دوم حاملگی بیشترین درصد و در چهارمین نوبت کمترین درصد را به خود اختصاص می دهد و از طرفی بین ابتلا به واژینال کاندیدیازیس و ماه حاملگی نیز پراکندگی یکسانی در نمونه ها وجود نداشت و آزمون کای دونیز اختلاف معنی داری را نشان نمی داد. نتیجه گیری: انجام این پژوهش بیان می دارد که میزان شیوع واژینال کاندیدیازیس در زنان حامله شهرستان کرج تقریباً 2 برابر زنان غیر حامله است و نهایتاً اینکه حاملگی یک ریسک فاکتور جهت ابتلا به واژینال کاندیدیازیس می باشد.

کلمات کلیدی:

حاملگی، واژینال کاندیدیازیس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/898612>

