

عنوان مقاله:

روش های کاهش درد محل ورود سوزن فیستول شریانی- وریدی در بیماران تحت همودیالیز

محل انتشار:

مجله دانشکده پرستاری ارتش، دوره 15، شماره 2 (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

سید هادی میرتاج الدینی - دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری

فاطمه کلروزی - کارشناس ارشد پرستاری، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه کودکان

سید امیرحسین پیشگوی - دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی- جراحی.

ناصر صدقی گوی آقاچ - کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی، ایران، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، گروه پرستاری

خلاصه مقاله:

مقدمه: درد محل ورود سوزن فیستول شریانی- وریدی در بیماران تحت همودیالیز به دلیل ایجاد احساس ناخوشایند و آزار دهنده در فرد، کیفیت زندگی او را کاهش می دهد و از نظر مالی نیز آسیب جبران ناپذیری را به پیکر اقتصاد جامعه وارد می سازد. مدیریت درد در حوزه ی کاری تمام متخصصان سلامت و به ویژه پرستاران بوده و به عنوان بخشی از پرستاری جامع محسوب می شود، لذا، این مطالعه به بررسی راه های کاهش درد محل ورود سوزن فیستول شریانی- وریدی در بیماران تحت همودیالیز می پردازد. مواد و روش ها: مقاله ی حاضر یک مقال هی مروری است که با استفاده از منابع اینترنتی از جمله Google Scholar، Magiran، Elsevier Sciences Direct، PubMed، و منابع کتابخانه ای با کلید واژه، Pain، Dialysis، Arteriovenous، Fistula بین سال های 2005 تا 2015 تدوین شده است. یافته ها: در درمان درد در هنگام ورود سوزن به درون رگ و بدن از روش های طبی و سنتی، یا روش های دارویی و غیر دارویی می توان استفاده کرد. روش دارویی و غیردارویی برای کاهش درد بیشتر از درمان های طبی و سنتی استفاده می شود. اسپری لیدوکائین، کرم پریلوکائین، کرم املا و پماد پیروکسیکام از جمله روش های دارویی و تحریک پوست، سرما درمانی، استنشاق اسطوخودوس، تنفس ریتمیک، حمام گرم پا، تحریک الکتریکی از راه پوست، انحراف فکر برنامه ریزی شده، از روش های غیردارویی کاهش این درد می باشند. مزایای روش های غیردارویی کاهش درد همچون سادگی استفاده، راحت، کم هزینه، کم عارضه، سریع بودن، غیرتهاجمی و قابلیت استفاده در پرستاری می باشد و امروزه محققین مشغول بررسی روش های نوینی هستند که بتوان درد را بهتر مدیریت نمود. بحث و نتیجه گیری: یکی از موارد قابل توجه در پرستاری از بیماران دیالیزی توجه به درد در این بیماران می باشد و با توجه به ضرورت آشنایی پرستاران با روش های کاهش درد، استفاده از آنها برای کاهش درد محل ورود سوزن در بیماران تحت همودیالیز پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی:

درد، فیستول شریانی- وریدی، همودیالیز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/898715>



