

عنوان مقاله:

بررسی مشخصات بالینی بیماران مبتلا به سکته مغزی در بدو ورود به بیمارستان کوثر سمنان

محل انتشار:

پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

سمیه قزلو - کارشناس پرستاری، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

زهرا انصاری - کارشناسی ارشد مراقبت ویژه، بیمارستان نمازی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محسن سلیمانی - دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری سمنان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

خلاصه مقاله:

مقدمه: سکته مغزی از شایعترین علل ایجاد ناتوانی و مرگ در ایران محسوب می شود بطوریکه هزینه های زیادی به خانواده و سیستم های مراقبتی وارد می کند. شناخت عوامل خطر این بیماری در مناطق مختلف می تواند به کاهش بروز این بیماری کمک کند. هدف این مطالعه بررسی مشخصات بالینی بیماران مبتلا به سکته مغزی در زمان بستری در بیمارستان کوثر سمنان می باشد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی گذشته نگر است که در آن پرونده 110 بیمار بستری شده با تشخیص سکته مغزی بصورت گذشته نگر در یک بازه زمانی 3 ساله مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه اطلاعات دموگرافیک، سابقه دیابت، فشار خون، بیماری قلبی و فاکتورهای خونی، علائم حیاتی و علائم بیماران مبتلا به سکته مغزی در زمان پذیرش در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه داده ها با استفاده از نرم افزار Spss ver.22 در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که بیشتر بیماران مورد مطالعه مرد (66%) بودند و میانگین سنی بیماران مورد مطالعه $72 \pm 28/14$ سال با محدوده بین 20 تا 105 سال بود. میانگین فشار خون سیستول بیماران $140 \pm 06/31$ میلیمتر جیوه بود. میانگین قند خون بیماران در زمان مراجعه $138 \pm 5/56$ میلیگرم بر دسی لیتر بود. بیشتر بیماران سیگاری نبودند (3/57%) ولی سابقه فشار خون بالا (9/69%) داشتند. بیشتر بیماران مورد مطالعه در زمان پذیرش دچار آفازی (9/70%) و همی پلژی (6/80%) بودند اما سردرد نداشتند (4/86%). سطح هوشیاری (GCS) بیشتر آنها بین 10 تا 15 بود. بیشتر موارد بروز سکته مغزی در اواخر تابستان و اوایل پاییز بود. نتیجه گیری: در این مطالعه فشار خون بالا و دیابت از جمله مهمترین فاکتورهای خطر محسوب می شد و بیشترین علائم بالینی همراه در بیماران آفازی و همی پلژی بود. بنظر میرسد بروز سکته مغزی در اواخر تابستان و اوایل پاییز بیشتر باشد. مطالعه بیشتر در این خصوص ضروری بنظر می رسد.

کلمات کلیدی:

سکته مغزی، علائم بالینی، فاکتورهای خطر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/933533>

