

عنوان مقاله:

بررسی عوامل موثر در تاخیر مراجعه به بیمارستان پس از وقوع استروک حاد

محل انتشار:

مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره 23، شماره 4 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

مسعود غیاثیان - استادیار، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

شهیر مظاهری - دانشیار، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

فایزه هاشمی رهبریان - دکتری حرف های پزشکی، دانشکده علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: مراجعه به موقع پس از استروک و استفاده از درمانهای نوین همانند r-tPA و ریدی و کنترل فشارخون باعث تسریع در بهبود علائم پس از سکته مغزی می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل موثر در تاخیر مراجعه به بیمارستان پس از وقوع استروک حاد در بیماران است. روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 425 بیمار که پس از وقوع استروک به بیمارستان فرشچیان همدان در سالهای 1394 - 1395 مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک، مدت زمان مراجعه به مرکز درمانی، زمان وقوع استروک، ریسک فاکتورها، علائم بالینی استروک، نحوه ارجاع، فاصله تا مرکز درمانی و نوع استروک با استفاده از پرسشنامه و چک لیست جمع آوری شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و توسط آزمونهای آماری ANOVA، X² و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 70 / 12 سال بود. 260 نفر 61 / 2 درصد از افراد شرکت کننده مرد بودند. 6 / 85 درصد استروک از نوع ایسکمیک داشتند. میانگین زمانی مراجعه به اولین مرکز درمانی و بیمارستان فرشچیان به ترتیب 2 / 06 و 4 / 77 ساعت بود. 36 / 2 درصد افراد کمتر از 2 ساعت پس از وقوع سکته مغزی به بیمارستان فرشچیان مراجعه کردند. جنسیت مرد، سکته از نوع ایسکمیک، تحصیلات پایین، فاصله بیشتر از مرکز درمانی، ارجاع از سایر مراکز درمانی، زندگی مجردی، نبود شاهد، سکته هنگام شب، سکته در منزل از عواملی بودند که باعث تاخیر در رسیدن به مرکز درمانی می شد. شایعترین علامت بالینی در بیمارانی که کمتر از 2 ساعت مراجعه کرده بودند کفوزیون و کاهش سطح هوشیاری با فراوانی 29 / 2 درصد بود. 61 / 4 درصد از بیمارانی که کمتر از 2 ساعت مراجعه داشتند، فشار خون بالا شایعترین عامل خطر در بین آنها بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر زمان مراجعه جهت درمان بیماران پس از بروز سکته مغزی از میانگین بالایی برخوردار است عواملی چون فاصله زیاد از مرکز درمانی، نداشتن آگاهی کافی در مورد علائم استروک، رخداد استروک در شب، عدم مراجعه مستقیم به مرکز تخصصی، زندگی بهتنهایی و نبود شاهد در زمان سکته از عوامل احتمالی تاخیر پس از بروز سکته به مراکز درمانی است.

کلمات کلیدی:

استروک حاد تاخیر پیش بیمارستانی مراقبت اورژانسی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/937367>

