

عنوان مقاله:

گزارش یک مورد نادر توده قارچی آسپرژیلوما داخل حفره قدیمی سل ریوی

محل انتشار:

مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره 24، شماره 1 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

محمد مهدی مجذوبی - استادیار، مرکز تحقیقات بروسوز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

حمیدرضا قاسمی بصیر - استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

حمید گل محمدی - استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

فاطمه ترکمان اسدی - متخصص بیمار یهای عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات انتقال خون، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، پایگاه منطق های انتقال خون، همدان، ایران. استادیار، گروه بیماریهای عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: توده قارچی فونگوس بال عارضه نادری است که در حفره به جا مانده از بیمار یهای چون سل، آبسه ریه، سارکوییدوز و ... ایجاد میشود. اغلب ناشی از قارچ آسپرژیلوس میباشد، در بیشتر موارد بدون علامت است اما م ی تواند با سرفه و هموپتیزی که گاه شدید و کشنده است، تظاهر نماید. اساس تشخیص مبتنی بر شواهد رادیولوژی همراه با رشد قارچ در محیط کشت و یا آنتی بادی آسپرژیلوس در سرم بیمار است. هدف از این گزارش توجه بیشتر به این بیماری در بیماران با سابقه سل ریوی است که مجددا با شکایات ریوی مراجعه نموده اند. معرفی بیمار: بیمار زنی 23 ساله که با سرفه، هموپتیزی، تب و لرز، تعریق شبانه و سابقه دو سال قبل سل ریوی درمان شده در بخش عفونی بیمارستان فرشچیان سینا همدان در فروردین ماه 95 بستری شد. نمونه خلط و نمونه تهیه شده از لاولژ آلوئو لهای بیمار از نظر باسیل سل و سیتولوژی منفی اما کشت آن ها از نظر آسپرژیلوس نیجر مثبت شد. در سی تی اسکن ریه یک فونگوس بال داخل کاویته لوب فوقانی ریه راست با وضعیت dependent مشاهده شد. وجود توده قارچی پس از انجام جراحی لوب مبتا در نمونه پاتولوژی تایید شد. نتیجه گیری: در بیماران با سابقه سل ریوی کاویته دار که با سرفه و هموپتیزی مراجعه میکنند، در کنار تشخیص هایی چون پنومونی، سل و بدخیمی ها، از نظر احتمال عفونت های قارچی نیز دقت شو د .

کلمات کلیدی:

توده قارچی خلط خونی سل ریه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/937388>

