

عنوان مقاله:

مروری بر تومور پیندبورگ

محل انتشار:

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، دوره 35، شماره 3 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسنده:

عطاءالله حبیبی - دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خلاصه مقاله:

مقاله مروری حاضر تومور پیندبورگ یا Calcifying Epithelial Odontogenic Tumor که به اختصار CEOT نوشته می شود و بر مبنای 210 مقاله موجود در کلیه انتشارات منتشر شده به زبان انگلیسی است. از این تعداد 193 مقاله داخل استخوانی و 17 مورد آن خارج استخوانی است. این تومور یک نئوپلاسم خوش خیم نادر است که 1% کل تومورهای ادنتوژنیک را تشکیل می دهد. 95% آن داخل استخوانی و 5% آن در خارج استخوان می باشد. منشأ آن از اپی تلیوم ادنتوژنیک می باشد. جایگاه آن در فک پایین و در ناحیه پرمولر و مولرها می باشد. این تومور رشد بطئی داشته و موضعی رشد می نماید. میانگین سن CEOT داخل و خارج استخوانی به ترتیب 39 و 34 سال می باشد. CEOT تنوع جنسی یکسان دارد و نسبت ابتلاء ماندیبول به ماگزبلا، 3 به 1 است. توافق اکثریت مولفین به داشتن منشأ از دنتال لامینا یا بقایای آن می باشد.

کلمات کلیدی:

نئوپلاسم، pindborg tumor, calcifying epithelial odontogenic tumour

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/945343>

