

عنوان مقاله:

بررسی شیوع تولدهای چندقلویی و عوامل موثر بر آن در مراجعین مرکز پزشکی مهدیه تهران طی سال 1371

محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 2، شماره 1 (سال: 1377)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسنده:

عصمت باروتی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، بیمارستان مهدیه

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: با توجه به شیوع چندقلویی و دخالت و نقش عوامل مختلف در بروز آن و به منظور تعیین شروع تولدهای چندقلویی و عوامل موثر بر آن، این تحقیق بر روی مراجعین به مرکز پزشکی مهدیه تهران در سال 1371 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی (Descriptive) بر روی 11775 مورد زایمان تک قلو و چندقلویی (CI) صورت پذیرفت و خصوصیات فردی خانم های دارای زایمان چندقلویی، روش های پیشگیری از حاملگی، نمایش های جنین، طول مدت حاملگی، وزن جنین بررسی و ثبت شد و شیوع دوقلویی و فاصله اطمینان آن محاسبه گردید. یافته ها: شیوع زایمان دوقلویی 6/2 در هزار با اطمینان 95 درصد و شیوع آن در جامعه حدود 6/7 - 5/9 در هزار برآورد می شود. خانم ها در سنین $27/7 \pm 6/8$ سال با مرتبه زایمانی $1/9 \pm 2/3$ بودند. دوقلویی دو تخمکی 69/4 و یک تخمکی 30/6 درصد، زایمان قبل از ترم در 36/6 درصد و زایمان به روش سزارین در دوقلویی 51/3 درصد می باشد که در تکقلویی 14/7 درصد است. در نوزادان به دنیا آمده وزن زیر 2500 گرم در قل اول 49/3 درصد و در قول دوم 50/7 می باشد. نتیجه گیری: حاملگی چندقلویی به دلیل افزایش عوارض مادری جنینی و خطر زایمان زودرس و تولد نوزادان پره ماچور جز حاملگی های پرخطر (High Risk) محسوب گردیده و احتیاج به مراقبت های ویژه دوران بارداری به منظور کاهش عوارض آن دارد و پیشگیری از تولد نارس به دلیل عواقب سوء این نوع تولد ها باید یک اولویت ملی محسوب شود.

کلمات کلیدی:

اییدمیولوژی چندقلویی، مرتبه زایمان، روش های پیشگیری از بارداری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/946625>

