

عنوان مقاله:

تاثیر دروپریدول و متوکلوپرامید در جلوگیری از استفراغ بعد از عمل

محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 3، شماره 1 (سال: 1378)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

صمد نوری زاد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان، گروه بیهوشی

محسن ادیب حاج باقری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان، دانشکده پرستاری و مامایی

علیرضا یزدانی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان، دانشکده پرستاری و مامایی

احمد ارشادی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان، دانشکده بهداشت

خلاصه مقاله:

سابقه وهدف: با توجه به خطرات استفراغ بعد از عمل و نیز گزارش های متفاوت در زمینه پیش گیری دارویی از این عارضه، در این تحقیق تاثیر تزریق وریدی دو داروی دروپریدول و متوکلوپرامید برای جلوگیری از استفراغ بعد از عمل مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت تجربی (Experimental) و دوسوکور بر روی 430 نفر که تحت جراحی های شکمی بودند، صورت پذیرفت و تاثیر این دو گروه داروها با گروه شاهد آن ها در پیش گیری از استفراغ بعد از عمل تعیین گردید. خطر نسبی و منتسب عدم دریافت دروپریدول و متوکلوپرامید محاسبه گردید و با آزمون $X(2)$ قضاوت آماری شد. یافته ها: 50/5 درصد از نمونه را زنان و 49/5 درصد را مردان تشکیل دادند. 120 نفر متوکلوپرامید، 165 نفر دروپریدول دریافت کرده و 145 نفر نیز دارویی دریافت نکردند. درصد بروز استفراغ در گروه های سه گانه فوق، به ترتیب 10، 3 و 29 درصد بود ($P<0/0005$). خطر بروز تهوع و استفراغ در عدم دریافت دروپریدول 6/7 برابر و خطر انتساب عدم دریافت آن 17 درصد و عدم دریافت دروپریدول در مقام مقایسه با متوکلوپرامید به ترتیب 3/3 برابر و 7 درصد است.

کلمات کلیدی:

تهوع و استفراغ، متوکلوپرامید، دروپریدول

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/946679>

