

عنوان مقاله:

مقایسه تاثیر و دوز نیفیدپین بر فشار و شاخص های متابولیک خون بیماران با فشار خون اولیه

محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 3، شماره 4 (سال: 1378)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

سیدغلامرضا فنایی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی تهران، گروه فارماکولوژی

احمد محبی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، گروه قلب

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: با توجه به فراوانی بیماران مبتلا به فشار خون اولیه و تناقض هایی که در مورد تاثیر نیفیدپین به تنهایی در فشار و شاخص های متابولیک خون وجود دارد و به منظور مقایسه دو دوز 20 و 30 میلی گرم نیفیدپین به تغییرات فشار و شاخص های متابولیکی خون، این تحقیق بر روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی طی سال 1373 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش کارآزمایی بالینی از نوع Cross over بر روی 36 نفر (72 نمونه) صورت پذیرفت و بیماران به طور تصادفی به دو گروه 18 نفری تقسیم شده و در یک گروه نیفیدپین (کارخانه Novopharm، کانادا) به میزان 20 میلی گرم در روز و در گروه دیگر به میزان 30 میلی گرم در روز تجویز و پس از هفته های مختلف تا هفت هفته فشار خون سیستول، دیاستول و نیز شاخص های سدیم، پتاسیم، گلوکز، تری گلیسیرید، کلسترول، کراتین و اسید اوریک بررسی و پس از آن جای بیماران و دوز نیفیدپین آن ها تغییر نمود و دوباره شاخص های مذکور موردسنجش قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

نیفیدپین، فشار خون، سیستول، دیاستول

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/946721>

