

## عنوان مقاله:

کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی شهرستان کاشان طی سال 1377

## محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 5، شماره 1 (سال: 1380)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

## نویسندگان:

محبوب لسان پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیدمحمد متینی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محسن تقدسی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سیدغلامعباس موسوی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

## خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: بیماری‌رانی که به مرحله پایانی نارسایی کلیه می‌رسند (End Stage Renal Disease)) برای ادامه حیات نیاز به دیالیز دارند. عدم کفایت دیالیز از علل افزایش مرگ و میر معرفی گردیده است. امروزه بیش از 200 هزار نفر مبتلا به نارسایی کلیه در آمریکا و بیش از یک میلیون نفر در جهان با دیالیز به حیات خود ادامه دهند. از این رو، با توجه به روشن نبودن وضعیت نتایج دیالیز بیماران مذکور، این تحقیق جهت بررسی کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی شهرستان کاشان سال 1377 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: نوع مطالعه، توصیفی است. نمونه‌ها به روش سرشماری و بیماران مبتلا به ESRD تحت درمان با همودیالیز انتخاب گردیدند. پس از تکمیل پرسشنامه‌ای که شامل متغیرهای سن، جنس، قد، وزن و زمان دیالیز و محاسبه مقادیری از قبیل  $\text{Del KT/V}$  و  $\text{Pres KT/V}$  و  $\text{nPCR}$  و ... اطلاعاتی به دست آمد. سپس اطلاعات طبقه بندی و به کمک شاخص‌های آمار توصیفی به صورت جداول فراوانی ارائه شد. یافته‌ها: این بررسی بر روی 37 نفر صورت پذیرفت و بیماری‌رانی که به علل دیگر مثل مسمومیت دارویی در مدت انجام تحقیق مورد دیالیز قرار گرفته‌اند، حذف گردیدند. از مجموع بیماران مورد مطالعه، 15 نفر (40/5 درصد) زن و 22 نفر (59/5 درصد) مرد بودند. میانگین کلی  $\text{Pres KT/V}$  معادل 1/04، در مردان 0/92 و در زنان 1/23 و میانگین کلی  $\text{Del KT/V}$ ؛ 0/46 در مردان و 0/45 در زنان بود. در مورد مطالعه  $\text{nPCR}$ ، میانگین کلی 0/378 و در زنان و مردان به ترتیب 0/39 و 0/38 بود. میانگین  $\text{Tacurea}$  در کل 34/06، در مردان 33/8 و در زنان 33/34 بود. میانگین کلی  $\text{URR}$ ؛ 0/3 تعیین شد که در زنان و مردان به ترتیب 0/31 و 0/29 می‌باشد. در نهایت؛ 7 نفر (18/9 درصد) از دیالیز کافی یعنی  $\text{KT/V}$  بالای 1/2 برخوردار بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به بی‌کفایتی دیالیز در تقریباً 80 درصد بیماران همودیالیزی، تحقیقات وسیع‌تری به منظور شناخت علل آن لازم است. همچنین بررسی آن در سایر شهرهای کشور صورت گیرد تا با اصلاح شرایط لازم امکان دستیابی به دیالیز با کفایت مطلوب جهت بیماران همودیالیزی فراهم آید.

## کلمات کلیدی:

نارسایی کلیه، مزمن، دیالیز

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/946810>



