

عنوان مقاله:

معیارهای بالینی و پاراکلینیکی اختلالات تیروئید در افراد بالای 15 سال

محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 5، شماره 3 (سال: 1380)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

حسین شریفی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان- گروه داخلی

امیرحسین امامی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان- گروه داخلی

سیدحسین موسوی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان- گروه داخلی

محسن تقدسی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشکده پرستاری و مامایی

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: اختلالات تیروئید در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. با توجه به اهمیت اختلالات تیروئید و وقت گیر بودن و هزینه بر بودن راه های تشخیصی این اختلالات و پیشنهاد امتیاز بندی برای تشخیص زودرس این اختلالات این مطالعه به منظور مقایسه معیارهای بالینی و پاراکلینیکی اختلالات تیروئید در افراد بالای 15 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی کاشان طی سال های 78-1375 و درمانگاه غدد متابولیسم امام خمینی طی سال 1379 صورت پذیرفت. مواد و روش ها: این یک مطالعه از نوع تشخیصی بوده که بر روی بیماران در سنین 60-15 ساله و مشکوک به اختلالات تیروئید انجام گرفت. ابتدا توسط متخصصان داخلی و براساس معیارهای بالینی Flipp Fling چنانچه جمع جبری 18 و بیشتر بوده، به عنوان هیپرتیروئیدی تلقی و چنانچه میزان نمره آن ها 11-18 به عنوان مشکوک و کمتر از آن به عنوان یوتیروئید بوده و در امتیاز هیپوتیروئید نمره بالای 19+ هیپوتیروئیدی محسوب شدند. سپس از کلیه بیماران T(3)، T(4) و Free T(4) (TSH) درخواست شد. TSH زیر 0/3 میکروگرم و T(4) بیش از 12 و T(3) بیش از 180 هیپرتیروئید و افراد با TSH بیش از 5 میکروگرم و T(4) کمتر از 4 میکروگرم و T(3) کمتر از 8 میکروگرم هیپوتیروئید تلقی شدند. سایر افرادی که مقادیر پاراکلینیک آن ها طبیعی بود سالم بودند.

کلمات کلیدی:

هیپوتیروئیدی، هیپرتیروئیدی، یونیروئیدی، TSH، T(3)، T(4)

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/946833>

