

عنوان مقاله:

مقایسه اثر مصرف متناوب با مصرف مداوم فنوباربیتال در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب

محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 6، شماره 4 (سال: 1381)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:

احمد طالبیان - گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ماه آفرین صالحیان - گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

زهره سادات - گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: با توجه به شیوع نسبتاً بالای تشنج ناشی از تب و به لحاظ این که در صورت عدم پیشگیری تشنج ممکن است حالت عود کننده داشته باشد و از طرف دیگر با در نظر گرفتن مشکلات و عوارض ناشی از پیشگیری با فنوباربیتال در این بیماران، جهت ارایه روشی کم هزینه تر، مناسب تر و با عوارض جانبی کمتر برای پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب، این تحقیق در بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه تجربی و از نوع کارآزمایی بالینی می باشد که بر روی 100 کودک مبتلا به تشنج ناشی از تب صورت گرفت. بیماران بعد از همانندسازی به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند. به یک گروه در موقع تب دیازپام خوراکی به میزان 0/8 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم روزانه در سه دوز منقسم تجویز شد (گروه مورد) و در گروه دیگر فنوباربیتال خوراکی به میزان 5 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم روزانه به طور مداوم تجویز شد (گروه شاهد). بیماران هر 2 ماه یک بار به مدت 6 ماه از نظر عود تب و تشنج پیگیری شدند.

کلمات کلیدی:

تشنج ناشی از تب، دیازپام، فنوباربیتال

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/946909>

