

عنوان مقاله:

تعیین میزان بقا لوسمی حاد کودکان بر اساس وضعیت عود بیماری در بیمارستان شهید فقیهی شیراز طی سال های 1383 تا 1388

محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 16، شماره 3 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

امیر الماسی حشینی - مربی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

سهیلا زارعی فر - استادیار، مرکز تحقیقات هماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اکبر هاشمی طبر - مربی، گروه هماتولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: عود در بیماران مبتلا به لوسمی به عنوان دلیل عمده شکست درمان و کاهش میزان بقا به شمار می رود. هدف از این مطالعه تعیین میزان بقا بیمار بر اساس وضعیت عود در بیماران مبتلا به لوسمی نوع Acute Lymphoblastic (Leukemia) ALL و (Acute Myeloid Leukemia) AML مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه هم گروهی گذشته نگر، کلیه بیماران (243 مورد) زیر 15 سال مبتلا به سرطان لوسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز بین سال های 1383 تا 1388 وارد مطالعه شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش های کاپلان مایر، آزمون لگاریتم رتبه و مدل رگرسیونی کاکس و با استفاده از نرم افزار SPSS و پیرایش 16 انجام شد. نتایج: میزان بقا 1 و 5 ساله در بیمارانی که سابقه عود نداشتند، 96/9 و 76/9 درصد به دست آمد؛ در حالیکه میزان بقا در بیمارانی که سابقه عود داشتند به ترتیب برابر با 82/4 و 28/6 درصد برآورد گردید که نشانگر وجود ارتباط معنی داری بین سابقه عود و میزان بقا بیماران میباشد (P=0/001). نتیجه گیری: سابقه عود به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در میزان بقا بیماران مبتلا به لوسمی می باشد و در این مرکز میزان بقا 5 ساله در این گروه از بیماران کمتر از 30 درصد است.

کلمات کلیدی:

لوسمی حاد لنفوبلاستیک، لوسمی حاد میلو بلاستیک، عود، میزان بقا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/947449>

