

عنوان مقاله:

نتایج مصرف ترکیبی دگزامتازون تزریقی و کرومولین موضعی با کراتوکونژنکتیویت بهاره

محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 18، شماره 5 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

حسن فرجی پور - استادیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مهدی شاعری - استادیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پگاه قاسمی - دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین نتایج درمان ترکیبی کرومولین موضعی و دگزامتازون تزریقی سوپراتارسل و کرومولین موضعی تنهایی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان طی سال 1391 صورت گرفت. مواد و روشها: مطالعه تحلیلی حاضر بر روی هر دو چشم 84 بیمار مبتلا به کراتوکونژنکتیویت متوسط تا شدید انجام شد. بیماران به-طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بیماران گروه اول تحت درمان با قطره کرومولین (هر 6 ساعت به مدت 3 هفته) و بیماران گروه دوم علاوه بر دریافت کرومولین به شکل مذکور، تحت تزریق دگزامتازون سوپراتارسل (0/5 میلی لیتر در هر چشم) قرار گرفتند. سه هفته بعد، هر دو گروه از نظر تاثیر درمان و بهبودی خارش، اشک ریزش و قرمزی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: گروه ها در وضعیت خارش تفاوت معنی دار با هم نداشتند، اما در بهبود التهاب، قرمزی و اشک ریزش، تاثیر درمان ترکیبی کرومولین و دگزامتازون به طور معنی داری بهتر از گروه دیگر بود ($P < 0/05$). خارش و اشک ریزش در 68/3 درصد و التهاب و قرمزی در 88/1 درصد بیماران تحت درمان ترکیبی کرومولین و دگزامتازون بهبود یافت، در حالیکه در گروه تحت درمان با کرومولین در نیمی از بیماران خارش، قرمزی و التهاب ثابت ماند یا بدتر شد. نتیجه گیری: تزریق سوپراتارسل دگزامتازون و مصرف کرومولین موضعی به طور همزمان، درمان مناسبی در مبتلایان به کراتوکونژنکتیویت بهاره متوسط و شدید می باشد.

کلمات کلیدی:

کراتوکونژنکتیویت بهاره، کرومولین سدیم، دگزامتازون

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/947628>

