

عنوان مقاله:

نقد مقاله مقایسه اثرمیزوپروستول واژینال با لامیناریا در آماده سازی سرویکس برای القای لیبر زنان حامله ترم

محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 19، شماره 2 (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسنده:

مهری انصاری نیکی - مربی، گروه بهداشت مادران و کودکان، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

خلاصه مقاله:

در شماره یکم دوره هیجدهم مجله فیض مقاله ای تحت عنوان مقایسه اثرمیزوپروستول واژینال با لامیناریا در آماده سازی سرویکس برای القای لیبر زنان حامله ترم در صفحات 47-51 منتشر شده است که به نظر می رسد دچار نواقصی است که یافته ها و نتیجه گیری تحقیق را مخدوش می کند. لذا، ضمن تشکر از نویسندگان و دست اندکاران چاپ مقاله، خواهشمند است به منظور ارتقای کیفیت دانش مقاله نویسی، مطالب زیر را در یکی از شماره های مجله درج نمایید. در سطر پنجم بخش مواد و روشها نویسندگان ذکر کرده اند که جمعیت مورد مطالعه خانم هایی بوده اند که دیلاتاسیون صفر تا دو سانتیمتر و افاسمان صفر تا دو درصد داشته اند و تحت القای لیبر با شیاف میزوپروستول یا لامیناریای 3 میلی متری قرار گرفته اند، اما توضیح نداده اند که افاسمان دو درصد را چگونه تشخیص می داده اند باتوجه به اینکه لامیناریا در سه اندازه کوچک (3-5 میلی متر)، متوسط (8-6 میلی متر) و بزرگ (10-8 میلی متر) وجود دارد [1]، آیا از اندازه کوچک آن می توان برای سرویکسیکه 2 سانتیمتر دیلاتاسیون دارد استفاده کرد همچنین، بهتر بود ذکر می شد که لامیناریای 3 میلی متری حداکثر تا چند میلی متر می تواند افزایش قطر پیدا کند حداکثر زمان لازم برای رسیدن به بیشترین قطر چقدر است لامیناریا و میزوپروستول محصول کدام شرکت است همانطور که در مقدمه ذکر شده است، وضعیت سرویکس (که با تعیین نمره Bishop مشخص می شود) عامل مهمی در میزان موفقیت پاسخ به القای لیبر است [2]، اما در مورد اینکه تغییرات این عامل چگونه بررسی یا کنترل شده است، توضیحی وجود ندارد.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/947659>

