

عنوان مقاله:

بررسی علل حذف و تابع توزیع زنده مانی در میش های نژاد لری بختیاری

محل انتشار:

مجله پژوهش در نشخوارکنندگان، دوره 2، شماره 2 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

محمود وطن خواه - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

محمد علی طالبی - عضو هیئت علمی

خلاصه مقاله:

در این تحقیق از رکوردهای طول عمر 1802 راس میش، نتاج حاصل از 217 راس پدر و 851 راس مادر، مربوط به گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری (ایستگاه شولی) واقع در شهرکرد که طی سال های 1368 تا 1391 جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. داده ها با استفاده از رویه های Freq و Lifetest برنامه آماری SAS تجزیه شدند. نتایج نشان داد که میانگین طول عمر تولیدی میش ها 1774/37 روز (معادل 86/4 سال) بود. بیماری بالاترین علت حذف میش ها (22/51 درصد)، بویژه در شکم های زایش 1-3 بود. بعد از بیماری به ترتیب پیری، مشکلات باروری، تولید پایین، کشتار آزمایشی، حادثه فیزیکی، مازاد داشتنی و در آخر تیپ نامناسب بیشترین درصد علت حذف میش ها را به خود اختصاص دادند. احتمال شرطی تلفات با افزایش سن روندی افزایشی داشت در حالی که میزان زنده مانی تجمعی روند کاهشی نشان داد. نسبت خطر مرگ تا سن 6 سالگی به طور جزئی ولی بعد از آن به شدت افزایش نشان داد. بنابراین به منظور بهبود طول عمر و زنده مانی میش ها لازم است با بهبود شرایط محیطی و مدیریتی به پیشگیری و درمان بیماری ها مبادرت نمود.

کلمات کلیدی:

علل حذف، تابع زنده مانی، میش های لری بختیاری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/955272>

