

عنوان مقاله:

تاثیر امولسیون وریدی لیپیدی حاوی روغن ماهی بر رتینوپاتی نوزاد نارس (ROP)؛ بر اساس مطالعه مشاهده ای گذشته نگر

محل انتشار:

ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسنده:

گلناز قره باغی

خلاصه مقاله:

هدف: مطالعه به منظور تعیین تاثیر رژیم حاوی روغن ماهی بر شدت رتینوپاتی نوزاد نارس (ROP) انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه مشاهده ای گذشته نگر، 82 بیمار واجد شرایط برای مطالعه بودند. 43 نوزاد با INTRAlipid حاوی روغن سویا، فسفولیپیدهای تخم مرغ و گلیسرول تحت درمان قرار گرفتند و 39 نوزاد با SMOFlipid حاوی روغن سویا، روغن زیتون، روغن ماهی، تری گلیسیرید با زنجیره متوسط، فسفولیپیدهای تخم مرغ و گلیسرول تحت درمان قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک بیماران، morbidity های همراه، ناحیه (zone) ROP، مرحله (stage) ROP، وجود یا عدم وجود plus disease در معاینه اولیه و نیاز به درمان ROP در دو گروه ثبت و تحلیل شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ROP شدید در نوزادان نارس تحت درمان با امولسیون SMOFlipid در مقایسه با نوزادان تحت درمان با INTRAlipid کاهش می یابد. با این حال، نیاز به درمان برای هر دو گروه یکسان بود.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/968782>

