

## عنوان مقاله:

تاثیر توانبخشی وستیبولار در بهبود علائم تعادلی ناشی از MS

## محل انتشار:

چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا (سکته مغزی و ام اس) (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

## نویسنده:

عطاء حیدری - استادیار، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

## خلاصه مقاله:

MS یک بیماری عصب شناختی مزمن است، نشانه آن از بین رفتن میلین سیستم اعصاب مرکزی بصورت چند کانونی است که می تواند ساقه مغز را نیز در بر بگیرد؛ بیمارانی که مشکوک به MS هستند ممکن است شکایاتی از قبیل عدم تعادل، سرگیجه یا وزوز را گزارش دهند. این علائم معمولا در اختلالات سیستم وستیبولار محیطی نیز دیده می شود؛ استفاده از تست های وستیبولار در تشخیص MS کمک کننده می باشند اما استفاده از آزمون VEMP در تشخیص افتراقی می تواند به عنوان شاخص ترین تست مطرح باشد. افراد مبتلا به MS به درجاتی خستگی و محدودیت در انجام حرکات را نشان می دهند، انجام توانبخشی وستیبولار در بهبود وضعیت حرکتی این بیماران می تواند کمک کننده باشد. وازنظر بالینی می تواند باعث بهبود علائم MS مانند خستگی، اختلال در تعادل و ناتوانی ناشی از سرگیجه یا عدم تعادل در بیماران مبتلا به MS گردد. مطالعات نشان داده اند که با انجام توانبخشی وستیبولار در 4 هفته اول برنامه درمانی عمده بهبود عملکرد بیماران دیده می شود.

## کلمات کلیدی:

MS، VEMP، توانبخشی دهلیزی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/968992>

