

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی زیبایی بر وضعیت سلامت روانی مراجعه کنندگان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1396

محل انتشار:

دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

آرش نشاطی - دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

مسعود چهارتنگی - عضو هیات علمی گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

صدیقه حنانی - عضو هیات علمی گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

داود حیدری - کارشناس پرستاری، سرپرستار اتاق عمل بیمارستان امام خمینی (ره) اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

لیلا بختیاری - دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

فاطمه حیدری - دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: جراحی های زیبایی یکی از جراحی های شایع در جهان می باشد که فراوانی آنها روز به روز در حال افزایش است. یکی از شایع ترین جراحی های زیبایی لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی می باشد. در سال های اخیر جراحی های زیبایی در کشور ما بسیار افزایش یافته و در بسیاری از موارد موجب احساس رضایت گردیده اما در مواردی نیز برای بیمار مشکلاتی را بوجود آورده است. لذا بر آن شدیم تا به بررسی بررسی تاثیر لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی زیبایی بر وضعیت سلامت روانی مراجعه کنندگان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1396 بپردازیم. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بود. نمونه پژوهش شامل 35 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1396 بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت روانی GHQ-28 بود. پرسشنامه توسط بیماران یکبار قبل از عمل (pretest) و سپس یکبار دیگر یکماه بعد از عمل (post test) تکمیل شد. در نهایت اطلاعات توسط نرم افزار spss نسخه 16 و با کمک آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد 65 درصد از بیماران زن و بقیه مرد بودند. میانگین سنی خانمها 2.6 ± 19.25 و میانگین سنی آقایان 3.1 ± 25.7 بود. 74 درصد خانم ها و 40 درصد آقایان مجرد بودند. 8 نفر (22.85 درصد) از بیماران قبل از عمل دچار نشانه هایی از اختلال بودند اما بعد از عمل این میزان به 3 نفر (8.57 درصد) کاهش یافت. نتایج آنالیز داده ها نشان دهنده وجود ارتباط معنادار بین انجام جراحی زیبایی لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی با میزان سلامت روانی بیماران داشت ($P < 0.05$). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که اختلالات روانی در بین مراجعه کنندگان جهت انجام جراحی های زیبایی شیوع بسیار بالایی دارد. و انجام جراحی های زیبایی تا حدود بسیار زیادی این اختلال را کاهش می دهد. بنابراین توجه بیشتر مسئولین را می طلبد تا با برطرف کردن مشکلات مالی و هزینه های جراحی از طریق پرداخت حق بیمه و موارد مشابه در اسرع وقت نسبت به انجام این جراحی ها از طرف بیماران اقدام گردد.

کلمات کلیدی:

لیپوساکشن، ابدومینوپلاستی، سلامت روانی، GHQ-28

