

عنوان مقاله:

مقایسه اثرات درمانی و پیامد درمان با مورفین در مقایسه با متادون همراه با دیازپام و هالوپریدول در بیماران با درد مزمن و شدید مبتلا به سرطان مراجعه کننده به اورژانس

محل انتشار:

چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

سیمین نجف قلیان - دانشجوی دکتری تخصصی طب اورژانس. گروه طب اورژانس. دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اراک. ایران

محمد پروهان - استادیار طب اورژانس. گروه طب اورژانس. دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اراک. ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: عدم کنترل مناسب درد باعث مراجعات مکرر بیماران به اورژانس بیمارستان ها، طولانی شدن زمان بستری و تحمیل هزینه های درمانی بیشتر به بیماران و بیمارستان ها و شرکت های بیمه گر می شود. جهت تسکین درد بیماران مبتلا به سرطان با شدت درد متوسط تا شدید نیاز به درمان با مخدر می باشد. مورفین و متادون از مخدر های ارزان قیمت، شایع و کاربردی بوده لذا در مطالعه ما مورد استفاده قرار گرفتند. روش ها: مطالعه ما کار آزمایشی بالینی تصادفی بود که به صورت دوسوکور بر روی بیماران مبتلا به سرطان با شکایت درد شدید مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امیر المومنین و ولیعصر اراک انجام شد. در این مطالعه به تعداد 102 بیمار سرطانی با شکایت درد حاد به صورت کاملاً تصادفی به دو گروه دریافت کننده متادون، دیازپام و هالوپریدول و گروه دریافت کننده مورفین سولفات تقسیم شدند. نتایج: یافته ها نشان داد که در گروه دریافت کننده متادون 86.3 درصد از بیماران درد متوسط تا خفیف را تجربه کردند. اما در گروه دریافت کننده مورفین 90.2 درصد از بیماران درد متوسط تا خفیف را تجربه کردند. در بررسی درد 24 ساعته نیز مشخص شد تنها 21.1 بیماران دریافت کننده مورفین وضعیت بدون درد را گزارش کردند در حالی که در گروه دریافت کننده متادون 25.5 درصد از بیماران بدون درد بودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از یک مخدر کوتاه اثر مانند مورفین می تواند کنترل درد سریعتری داشته و علائم بیمار در یک ساعت اول بعد از مراجعه کاهش دهد. اما میزان درد در 24 ساعت بعد از دریافت دارو در گروه دریافت کننده متادون پایین تر از گروه دریافت کننده مورفین بود. لذا محقق استفاده از مخدر طولانی اثر در همراهی با ساداتیوها و آنتی سایکوتیکها را برای کنترل درد بیماران سرطانی با درد شدید را توصیه می نماید.

کلمات کلیدی:

درد، مورفین سولفات، متادون، هالوپریدول، دیازپام، سرطان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/987939>

