

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر همودیالیز با مایع دیالیز سرد بر کاهش میزان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی

محل انتشار:

فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 12، شماره 4 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

علی ایمانی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هیات علمی- کارشناس ارشد

محسن سلیمانی - دانشگاه علوم پزشکی سمنان- مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری- دکتری تخصصی

محمدرضا عسگری - دانشگاه علوم پزشکی سمنان- مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری- دکتری تخصصی

فاطمه مرادی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هیات علمی- کارشناس ارشد

اکبر پوررحیمی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هیات علمی- کارشناس ارشد

محمدرضا تمدن - دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشکی- عضو هیات علمی- استادیار.

خلاصه مقاله:

مقدمه: خارش اورمیک یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین عوارض بیماران همودیالیزی بوده که 50 تا 90 درصد آنها را گرفتار می کند. خارش می تواند منجر به عفونت پوستی، پوسته پوسته شدن، اضطراب، اختلالات خواب، اختلال در عملکرد اجتماعی و... در بیمار گردد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر همودیالیز با مایع دیالیز سرد بر کاهش میزان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی بود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بصورت قبل و بعد و دو سو کور بوده که تابستان 1391 در بخش همودیالیز بیمارستان فاطمیه سمنان انجام شد. از بین همه بیماران بخش همودیالیز، 35 نفر واجد شرایط مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرونده پزشکی و مقیاس خارش استفاده گردید. بیماران سه جلسه در هفته، هر جلسه چهار ساعت به مدت یکماه با همودیالیز استاندارد 37°C و ماه دوم با همان شرایط یکسان، با همودیالیز سرد 35°C همودیالیز شدند. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار خارش در مرحله استاندارد و سرد همودیالیز به ترتیب $23 \pm 10 / 3$ و $8 \pm 8 / 8$ بود. داده ها بیانگر ایناست که خارش بیماران در مرحله همودیالیز سرد به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود $0 / 001$

کلمات کلیدی:

همودیالیز سرد، همودیالیز استاندارد، خارش اورمیک، بیماری کلیوی مرحله نهایی.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/993196>

