

عنوان مقاله:

مقایسه مشخصات نوزادان حاصل زایمانی طبیعی و سزارین

محل انتشار:

همایش کشوری مامایی و سلامت زنان (به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران) (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

حسن بسکابادی - استاد نوزادان، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مریم ذاکری حمیدی - دکترای بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

فاطمه باقری - کارشناس ارشد نوزادان، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: سزارینهای بدون اندیکاسیون در مقایسه با زایمان طبیعی، عواقب بسیار زیادی برای مادر(خونریزی، عوارض بیهوشی، آمبولی، عفونت محل زخم، عفونت لگن، عفونت ریوی، عفونت مجاری ادراری، ترومبوز وریدی و عوارض روانی مانند عصبانیت، اضطراب، احساس گناه و ناامیدی و مرگ و میر بیشتر مادران) و نوزاد(مشکلات تنفسی شامل تاکی پنه گذرای نوزادی، سندرم زجر تنفسی و بستری نوزاد در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان) به همراه دارد. با توجه به آمار بالای زایمان سزارین و خطرات بیشتر آن در مقایسه با زایمان طبیعی و همچنین متفاوت بودن نتایج مطالعات مرتبط با موضوع مورد مطالعه، تحقیق حاضر با هدف مقایسه مشخصات نوزادی در زایمان های طبیعی و سزارین انجام شده است. روش کار: در این مطالعه مقطعی از سال 1394 لغایت 1398، 736 نوزاد ترم شیرمادرخوار 12-3 روزه با وزن بالای 2/5 کیلوگرم و سن حاملگی بیشتر از 37 هفته که به درمانگاه نوزادان مراجعه کرده بودند را پس از کسب رضایت از والدین، مورد بررسی قرار دادیم. پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوی اطلاعات فردی مادر، مشخصات نوزاد، وضعیت شیردهی و نوع زایمان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از تست های T-Test کای دو با نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در مطالعه حاضر، از 736 نوزاد ترم مورد بررسی، 409 نوزاد (55/6 درصد) به روش زایمان طبیعی و 327 نوزاد (44/4 درصد) به روش زایمان سزارین متولد شده بودند. بین دو روش زایمانی از لحاظ دفعات شیردهی در روز ($P=0/002$)، تعداد دفعات دفع ادرار در روز ($P=0/007$)، اولین زمان دفع مدفوع بعد از زایمان ($P=0/027$)، سن مادر ($P=0/000$) و وزن مادر ($P=0/002$) و شکایت اصل نوزادان ($P=0/004$) تفاوت آماری معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نوزادان حاصل زایمان طبیعی در مقایسه با زایمان سزارین وضعیت مطلوب تری از لحاظ دفعات شیردهی، تعداد دفعات دفع ادرار در روز و اولین زمان دفع مدفوع بعد از زایمان داشتند. مقدار کاهش وزن (گرم) و درصد کاهش وزن روزانه نوزاد در مادر سزارینی بیشتر بود.

کلمات کلیدی:

زایمان طبیعی، زایمان سزارین، مشخصات نوزادی، شیردهی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/997839>

