

عنوان مقاله:

مقایسه بین رشد و نمو هفت گیله زینتی در چهار منطقه مختلف جزیره کیش

محل انتشار:

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 3

نویسندگان:

نارسیس زرشناس حقیقی - دانشجوی کارشناسی ارشد

حسن صالحی - استادیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی - دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

جزیره کیش در خلیج فارس، سرزمین ایران قرار دارد و شرایط اقلیمی آن در کل خشک و نیمه استوایی است. گیاهان جزیره کیش که با آب با کیفیت پایین آبیاری می شوند با تنش های شوری و خشکی روبرو می باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رشد و نمو توسط اندازه گیری ویژگی های زینتی هفت گونه گیاه زینتی انجیر بنگالی (Ficus bengalensis L.) بنجامین L. Ficus benjamina، چریش L. azadirachta، ابریشم مصری Melia، تکوما ex Juss. Tecoma stans (L.) و کونوکارپوس Jack Conocarpus erectus و شمشاد نعنایی Euonymus japonica L. در 4 منطقه مختلف از جزیره کیش برای معرفی بهترین گونه برای هر منطقه انجام شد. در طی این پژوهش (فروردین تا شهریور ماه 1387)، طوا گیاه، سطح برگ، تعداد برگ، طول ساقه و تعداد گره 2 مرتبه و در انتهای پژوهش میزان پرولین نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاشت انجیر بنگالی برای هر 4 منطقه، کونوکارپوس برای منطقه سنایی، ابریشم برای منطقه های صدف و پاوون مناسب می باشد. همچنین گیاهان منطقه سفین به علت شوری خاک در این منطقه رشد کمتری نشان دادند. این پژوهش می تواند برای گزینش گیاهان زینتی در مناطقی با شرایط مشابه جزیره کیش، مفید واقع شود.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/99837>

